

HERPES SIMPLEX INFECTIE VAN HET OOG

Wat is het?

Herpes simplex is een virus dat infecties kan veroorzaken in de gevoelszenuwen naar de huid of slijmvliezen. Er zijn vele soorten herpes simplex virussen (HSV) maar de meest voorkomende zijn type I en II.

Type I komt het meest voor en is verantwoordelijk voor de herpes simplex oogontsteking en de bekende koortslip.


Type II is een seksueel overdraagbare aandoening en veroorzaakt zelden een ontsteking in het bovenlichaam.

Oorzaken

Een groot deel van de bevolking is drager van het HSV type I (ongeveer 75%). Het HSV "nestelt" zich in de gevoelszenuw van het aangezicht, meestal aan één kant van het gezicht. In sommige omstandigheden kan het virus actief worden en een koortslip of oogontsteking veroorzaken. Provocerende factoren zijn onder andere verminderde weerstand, UV-licht, stress of menstruatie.

Symptomen

De ziekte ontstaat over het algemeen aan het oppervlak van het hoornvlies, soms in de diepere lagen van het hoornvlies. Het hoornvlies is het doorzichtige, voorste deel van het oog, waardoor het licht het oog binnenkomt. Omdat het HSV zich meestal in de gevoelszenuw van het aangezicht aan één kant van het gezicht bevindt, ontstaat de ontsteking daardoor ook aan één oog. Het oog wordt rood, is geïrriteerd en gevoelig voor licht. Daarbij kan de gezichtsscherpte ook verminderd zijn.



Met een speciale oranje kleurstof en blauw licht kleurt een eventuele herpes infectie groen aan. Kenmerkend voor een herpesinfectie is het takvormige uiterlijk (zie foto).

Mogelijke behandelingen

De behandeling hangt af van de uitgebreidheid van de ontsteking. Vaak wordt antivirale medicatie gebruikt in de vorm van druppels en/of oogzalf. Indien er troebelingen op het hoornvlies optreden als reactie op de ontsteking, kunnen corticosteroïddruppels (ontstekingsremmers) worden gebruikt om deze reactie van het lichaam af te remmen en het hoornvlies weer helder te krijgen. Ook komt het regelmatig voor dat er tabletten met een antivirale werking worden voorgeschreven. Bij gebruik van deze tabletten wordt de infectie van binnenuit benaderd en neemt de kans op herhaling af.

De kans op een herhaling van een oogontsteking ten gevolge van het HSV is 10 % binnen het 1^e jaar en 20-25% binnen 2^e jaar.

Wanneer er sprake is van ernstige littekenvorming en het gezichtsvermogen hierdoor aanzienlijk is verminderd, kan een hoornvliestransplantatie worden overwogen.

Welke resultaten kunt u verwachten van de behandeling?

Of uw klachten volledig verdwijnen hangt af van de ernst en de diepte van de ontsteking. Indien er littekenvorming op het hoornvlies is ontstaan, zal het gezichtsvermogen waarschijnlijk niet volledig herstellen.

Mogelijke complicaties

Na het inbrengen van oogdruppels en/of de zalf kan het zicht tijdelijk verminderd zijn (zie bijsluiter in de verpakking).

Over het algemeen is er een kleine kans op bijwerkingen. Er bestaan echter ook medicijnen met een grotere kans op bijwerkingen. Lees daarom altijd goed de bijsluiter.

Bij het gebruik van oogdruppels kan de kans op lichamelijke (systemische) bijwerkingen aanzienlijk worden verminderd door het dichtdrukken van de traanbuis na het druppelen.

Hierdoor vloeit er minder oogdruppelvloeistof af naar de neus- en keelholte, zodat er minder werkzame stof wordt ingeslikt. De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen.

Wanneer er tijdens het gebruik van een medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, (3) overgevoeligheid of (4) een allergische reactie. Neemt u in dat geval contact met ons op.

Instructies voor thuis voorafgaand aan de behandeling

Voor het aanbrengen van de druppels of zalf, dient u de handen te wassen en goed te drogen.

Instructies voor begeleiding, opvang en vervoer

Indien de gezichtsscherpte voldoende is, kunt u zelf autorijden.

Het diepte zien kan verminderd zijn.

Instructies voor thuis na de behandeling

Een ontsteking van uw oog ten gevolge van het herpes simplex virus is erg besmettelijk. Het is daarom aan te bevelen de handen goed te wassen na contact met het oog en handdoeken of zakdoeken éénmalig te gebruiken.

Als u besluit zich te laten behandelen

Het is mogelijk dat u aan uw behandelend arts heeft aangegeven dat u bedenktijd wilt hebben om te besluiten of u zich wilt laten behandelen en/of welke behandelingen u wenst te ondergaan. Als u heeft besloten om u te laten behandelen of als u nog vragen heeft, wilt u dan telefonisch contact opnemen met onze medewerkers. Indien nodig zullen zij een extra consult voor u afspreken bij u behandelend arts.

Vragen en/of klachten

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw oogarts, physician assistent, optometrist of orthoptist.

Op onze website vindt u meer informatie over de behandelingen die wij uitvoeren, maar ook informatie over onze medewerkers en ons privacyreglement. Voor vragen en/of klachten kunt u altijd telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op onze website contact met ons opnemen. Onze medewerkers staan voor u klaar en geven deskundig antwoord op al uw vragen.

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris bemiddelt bij onvrede of klachten. Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen. Het Oogcentrum is aangesloten bij de geschillencommissie van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Meer informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op: zkn.nl/consumenten/over-zkn/geschillencommissie

Veiligheid

Een veilig verblijf voor iedereen in het Oogcentrum is voor ons een topprioriteit. Om uw veiligheid te waarborgen vragen wij u de instructies van de medewerkers van het Oogcentrum nauwgezet op te volgen. Onze medewerkers kennen de risico's.

Heeft u zich tijdens uw verblijf in het Oogcentrum op enig moment onveilig gevoeld of bent u een situatie tegengekomen die voor u of anderen in het Oogcentrum gevaarlijk kan zijn? U helpt ons door dat aan ons te melden. U kunt dat ter plekke melden aan iedere medewerker van het Oogcentrum of achteraf telefonisch, per brief of per e-mail. Wij bespreken alle meldingen en nemen de mogelijke maatregelen om gevaarlijke situaties op te lossen.

Oogcentrum Noordholland beschikt over de "Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld". Dit betekent dat een medewerker van Oogcentrum Noordholland bij het signaleren van dergelijke signalen volgens een vastgesteld stappenplan te werk gaat en mogelijk hulp biedt aan het slachtoffer of een melding doet bij "Veilig Thuis".

Bereikbaarheid

Oogcentrum Noordholland

Gildestraat 10

1704 AG Heerhugowaard

Telefoonnummer 088-9191800

Openingstijden ma-vr 8.00-16.30 uur

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 088-9191800.

Toetst u voor spoedgevallen buiten werktijden een 9 in. U wordt dan doorverbonden met één van de oogartsen van het Oogcentrum of met het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.

www.oogcentrumnoordholland.nl

info@oogcentrumnoordholland.nl